

Sorte Information	
Name	<b>Sprinter</b>
Kreuzungen	-
Vertreter	Royal Zap/Semagri
<b>Krankheit und Schädlinge</b>	
Nematodenresistenz	Ro1 8 (rv 2,41)    Ro2/3 7 (rv 3,61)    Ro4 9 Ro5 9
	Pa2 9 (rv 0,24)    Pa3 9 (rv 0,39)
Nematodentoleranz	NB
Krebs	fysio 1 10    fysio 2/6 8 fysio 8 NB    fysio 18 8
Phytophthora	Knolle 6    Kraut 6,5
Schorf	6
Virus	7
Bemerkungen	
<b>Verschiedene Eigenschaften</b>	
Knollenform	Rund
Keimfreudigkeit	7
Rodebeschädigung	-
Blaufleckigkeit	-
Lagerfähigkeit	-
Anzahl Knollen	-
Anfälligkeit Sencor	-
Eiwit%	-
Bemerkungen	
<b>Pflanzen</b>	

<b>Düngung</b>			
N	170 <i>+ 20 kg bei Sand-Mischkultur</i> <i>- 20 kg bei Moor Boden</i>		
P	Laut Düngemitteluntersuchung		
K	Laut Düngemitteluntersuchung		
Bemerkungen			
<b>Pflanzenentwicklung</b>			
Reifegruppe	3,5		
Krautentwicklung	-		
Bemerkungen			
<b>Relative Ertragsdaten</b>	Knollenertrag	Stärkegehalt	Stärkeertrag
Moor	-	-	-
Sand-Mischkultur	-	-	-
Bemerkungen			

Nematodentoleranz	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Krebs (fysio 2/6 und 18)	2 = sehr anfällig	10 = resistent
Phytophthora (Kraut und Knolle)	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Schorf	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Virus	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Keimfreudigkeit	2 = sehr keimfreudig	9 = wenig keimfreudig
Rodebeschädigung	2 = sehr empfindlich	9 = wenig empfindlich
Blaufleckigkeit	2 = sehr blauanfällig	9 = wenig blauanfällig
Lagerfähigkeit	2 = schlecht lagerfähig	9 = gut lagerfähig
Anfälligkeit Sencor	2 = sehr anfällig	9 = wenig anfällig
Reifegruppe	2 = spät	9 = früh
Krautentwicklung	2 = wenig Laub	9 = viel Laub